



Servicio
Extremeño
de Salud

Criterios Diagnósticos de Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota (Programa Internacional de la O.M.S. MED-PED)

Historia Familiar:			Puntuación
			En caso afirmativo
I.- Familiar de primer grado con enfermedad coronaria y/o vascular precoz	SI	NO	1
II.- Familiar de primer grado con C-LDL \geq 210 mg/dl y/o	SI	NO	1
III.- Familiar de primer grado con Xantomas y/o Arco Corneal	SI	NO	2
IV.- Niño menor de 18 años con C-LDL \geq 150 mg/dl	SI	NO	2
Historia Personal:			
I.- Antecedentes de enfermedad coronaria precoz	SI	NO	2
II.- Antecedentes de enfermedad vascular periférica o cerebral precoz (precoz = < 55 años en varones y < 60 años en mujeres)	SI	NO	1
Exámen Físico:			
I.- Xantomas tendinosos	SI	NO	6
II.- Arco Corneal antes de los 45 años	SI	NO	4
Análítica en ayunas, con triglicéridos < 200 mg/dl			
I.- C-LDL \geq 330 mg/dl	SI	NO	8
II.- C-LDL 250 – 329 mg/dl	SI	NO	5
III.- C-LDL 190 – 249 mg/dl	SI	NO	3
IV.- C-LDL 155 – 189 mg/dl	SI	NO	1
TOTAL PUNTOS:			
Diagnóstico Clínico de Hipercolesterolemia Familiar:			
Cierto:	\geq 8 puntos	Probable:	6 – 7 puntos

Marque lo que corresponda. Sólo respuesta **afirmativa** puntúa para el diagnóstico clínico.

Familiar de primer grado: padre, madre, hermanos (as), hijos (as)

Enfermedad coronaria (infarto de miocardio, angina de pecho, angioplastia, revascularización coronaria) o vascular (claudicación intermitente; enfermedad carotídea sintomática, ictus, crisis isquémica transitoria; aneurisma de aorta abdominal, estudio de imagen vascular positivo, angioplastia vascular, cirugía de revascularización)

Precoz: es cuando ocurre antes de los 55 años en varones y antes de los 65 en mujeres.

La presencia de Xantomas tendinosos, **No incluye** a los xantelasma palpebrales.

La concentración de colesterol LDL para el cálculo de la puntuación es **SIN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y HABIENDO DESCARTADO CAUSAS SECUNDARIAS DE HIPERCOLESTEROLEMIA.**

Fdo.-.....

Fecha