



**Gerencia del  
Área de Salud  
de Badajoz**

**JUNTA DE EXTREMADURA**  
Consejería de Sanidad y Dependencia

# **GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS POR SONDA**

***CENTRO DE INFORMACIÓN DE  
MEDICAMENTOS  
SERVICIO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA  
ESPECIALIZADA DE BADAJOZ (SAFEBA)  
GERENCIA DEL ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ***

**Autores: Dra. Inmaculada Rangel Bravo  
Dr. Ignacio Fruns Giménez**

**Editor: Dr. Juan Fco. Rangel Mayoral**

## INTRODUCCIÓN

El uso de las sondas para administrar medicamentos requiere tener en cuenta distintos factores que pueden modificar la eficacia y seguridad del fármaco, como son: situación de la sonda, forma farmacéutica empleada o interacciones con la nutrición enteral. Para cada medicamento debemos elegir la forma farmacéutica adecuada y realizar una preparación y administración correcta para no obstruir la sonda, conseguir su efectividad, y evitar efectos adversos e interacciones.

En esta Guía se establecen recomendaciones para la administración de medicamentos a pacientes con sonda y se incluye una tabla con las presentaciones y forma de administrar aconsejadas para los medicamentos de mayor uso (**este documento en formato electrónico está disponible en la siguiente dirección de la intranet: <https://10.15.132.132>**).

## RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR SONDA NASOGÁSTRICA O NASOENTÉRICA

Las principales recomendaciones a seguir son las siguientes:

Antes de administrar, conocer dónde está situado el extremo de la sonda y verificar que está bien colocada.

Comprobar la permeabilidad con 30 ml de agua.

Preparar el fármaco para siguiendo las recomendaciones recogidas en la tabla. No añadir medicación a la bolsa de NE.

Administrar inmediatamente después de la preparación, no mezclar con otros fármacos.

Lavar con 5-30 ml de agua, para asegurar que no quedan restos de medicamento.

De forma periódica, cada 4 h aproximadamente, lavar con 15-30 ml de agua.

## ELECCIÓN DE LA FORMA DE ADMINISTRACIÓN

### **Formas farmacéuticas líquidas (Suspensiones, soluciones, jarabes, sobres, gotas)**

Son las más adecuadas para administrar por sonda, pero para muchos medicamentos no existen comercializadas. A menudo presentan valores de osmolalidad o viscosidad elevados que hacen necesaria su dilución para evitar efectos adversos o que queden adheridas a la sonda. En algunos casos se puede administrar el contenido de las ampollas, aunque no es una opción recomendada de forma general. Para otros fármacos es posible utilizar fórmulas magistrales líquidas preparadas en el Servicio de Farmacia.

### **Formas farmacéuticas sólidas (Comprimidos, grageas, cápsulas)**

Se pueden emplear siguiendo ciertas recomendaciones:

**Cápsulas.** Abrir, diluir el polvo en agua (10-20 ml) y administrar de forma inmediata. No triturar si contienen microesferas.

**Comprimidos disgregables en agua.** Algunos comprimidos se dispersan fácilmente en agua y se pueden disolver empleando una jeringa de la forma siguiente:

Retirar el émbolo, introducir el comprimido, volver a colocar el émbolo.

Aspirar el volumen de agua recomendado.

Agitar la jeringa hasta completa desintegración. La mayoría se dispersan en 3-5 min, aunque algunos requieren hasta 10 min.

Administrar inmediatamente por la sonda.

Administrar 5-10 ml de agua para arrastrar posibles restos de fármaco.

Repetir el proceso con los demás medicamentos. No mezclar más de uno en la jeringa.

Una vez administrados todos, lavar la sonda.

Esta sencilla técnica permite que no se produzcan pérdidas de medicamento durante la trituración y dilución.

**Grageas y comprimidos no disgregables en agua.** Se deben triturar en mortero y diluir en agua. Este procedimiento no se puede emplear si altera el mecanismo de liberación del principio activo, como sucede con las formas de liberación retardada ó de liberación entérica. Algunos principios activos son poco solubles en agua y para su disolución hay que emplear otros disolventes como la mezcla de agua y alcohol 96° a partes iguales (mezcla hidroalcohólica).

En ocasiones es necesario administrar el fármaco por otra vía: rectal, sublingual, parenteral, trasdérmica... o cambiar el fármaco por equivalentes terapéuticos que puedan ser más fácilmente administrados por sonda.

### **ADMINISTRACIÓN TRASPILÓRICA DE FÁRMACOS.**

La administración de medicamentos con osmolalidad elevada directamente en intestino puede provocar secreción de agua al tracto gastrointestinal y como consecuencia: distensión, espasmos, diarreas. En estos casos, se debe diluir con agua hasta conseguir un valor de osmolalidad adecuado.

### **ADMINISTRACIÓN CON NUTRICION ENTERAL**

La dieta enteral puede reducir la absorción de algunos fármacos, por lo que su administración debe realizarse 1h antes o 2h después de la nutrición. En algunos casos los alimentos favorecen la absorción o previenen los efectos adversos gastrointestinales, por lo que se deben administrar simultáneamente. Para otros medicamentos la administración puede ser realizada con o sin alimentos.

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
ABACAVIR	ZIAGEN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
ABACAVIR LAMIVUDINA ZIDOVUDINA	TRIZIVIR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
ACARBOSA	GLUCOBAY Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar inmediatamente antes de la NE
ACENOCUMAROL	SINTRON Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		
ACETAZOLAMIDA	EDEMOX Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
ACETILCISTEÍNA	FLUMIL Sobres	SOBRES Diluir en 50 ml de agua		
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	ASPIRINA Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 20 ml de agua	SOBRES <sup>1</sup> 500mg Disolver en 20 ml de agua 300 mg = 12ml 150 mg = 6 ml 100 mg = 4ml	Se puede administrar concomitantemente con la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
ACICLOVIR	ZOVIRAX Comprimidos dispersables	COMPRIMIDOS Dispersar en 30 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
ADENOFOVIR	HEPSERA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 50 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
ALBENDAZOL	ESKAZOLE Comprimidos recubiertos			El laboratorio fabricante recomienda no triturar esta especialidad. Considerar la sustitución por un equivalente terapéutico
ALMAGATO	ALMAX Suspensión	SUSPENSIÓN Diluir en 25 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
ALOPURINOL	ALOPURINOL EFG Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
ALPRAZOLAM	ALPRAZOLAM EFG	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
AMBROXOL	AMROXOL EFG MUCOSAN Jarabe Sobres	JARABE (15mg/5ml) 1 sobre = 20 ml jarabe Diluir en 15 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
AMILASA-LIPASA- PROTEASA	KREON Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10ml de agua	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de bicarbonato 1M	Se puede administrar concomitantemente con la NE No triturar los microgránulos
AMILORIDA- HIDROCLOROTIAZIDA	AMERIDE Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
AMINOCAPROICO ÁCIDO	CAPROAMIN FIDES Ampollas	AMPOLLAS Administrar directamente		Se puede administrar concomitantemente con la NE
AMIODARONA	TRANGOREX Ampollas Comprimidos	COPRIMIDOS Dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
AMITRIPTILINA	TRYPTIZOL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
AMLODIPINO BESILATO	NORVAS Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
AMOXICILINA TRIHIDRATO	AMOXICILINA EFG HOSBORAL Cápsulas/Sobres Suspensión	SUSPENSIÓN (250mg/5ml) Administrar directamente 250 mg = 5 ml 500 mg = 10 ml 750 mg = 15 ml	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE

**Autores: Dra. I. Rangel, Dr. I. Fruns**

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
AMOXICILINA CLAVULÁNICO	AMOXICILINA CLAVULÁNICO EFG AUGMENTINE Comprimidos Sobres	SOBRES Disolver en 20 ml de agua	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE No emplear las formas retard
ASCÓRBICO ÁCIDO	CEBIÓN Sobres	SOBRES Disolver en 50 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
ATAZANAVIR	REYATAZ Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
ATENOLOL	ATENOLOL EFG TENORMIN Comprimidos Amollas	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
ATORVASTATINA	CARDYL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
AZATIOPRINA	IMUREL Comprimidos Viales	Solicitar preparación de fórmula magistral extemporánea al Servicio de Farmacia <sup>3</sup>		Administrar preferentemente con la NE para disminuir molestias GI

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
AZITROMICINA	ZITROMAX Comprimidos Sobres	SOBRES Disolver en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
BACLOFENO	LIORESAL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Administrar concomitantemente con la NE
BENTAZEPAM	TIADIPONA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
BICARBONATO SÓDICO	BICARBONATO EFG Comprimidos	COMPRIMIDOS Disolver en 50 ml de agua		
BIPERIDENO	AKINETON Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE No emplear las formas retard
BISOPROLOL FUMARATO	EMCONCOR Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
BROMHEXINA	BISOLVON Gotas	GOTAS (2mg/ml) Diluir en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE



PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
BROMAZEPAM	LEXATIN Cápsulas		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE
BROMOCRIPTINA	PARLODEL Comprimidos		COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE
BUFLOMEDILO	LOFTON Comprimidos Ampollas		GOTAS <sup>1</sup> (150mg/ml) Diluir en 10 ml de agua 1 comprimido = 1ml	Se puede administrar concomitantemente con la NE No utilizar comprimidos, son de cubierta entérica
BUTILESCOPOLAMINA	BUSCAPINA Comprimidos recub. Ampollas		AMPOLLAS Administrar directamente 1 comprimido = ½ ampolla	Se puede administrar concomitantemente con la NE
BUTILESCOPOLAMINA METAMIZOL	BUSCAPINA COMPOSITUM Comprimidos recub. Ampollas		AMPOLLAS (2500mg/20mg) Administrar directamente 1 comp = ½ cáp metamizol (10ml) + ½ amp butilescopolamina	Se puede administrar concomitantemente con la NE
CABERGOLIDA	DOSTINEX Comprimidos		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE
CALCIO GLUCONATO	CALCIO SANDOZ FORTE Comprimidos efervescentes		COMPRIMIDOS Disolver en 20 ml de agua y agitar hasta finalizar la efervescencia	Administrar separadamente de la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
CALCITRIOL	CALCIJEX ROCALTROL Ampollas Cápsulas			No se recomienda administración por sonda. Alternativa: ampollas (1µg/1ml) vía parenteral
CAPTOPRILO	CAPTOPRIL EFG Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
CARBAMAZEPINA	TEGRETOL Comprimidos	Solicitar preparación de fórmula magistral extemporánea al Servicio de Farmacia		Se puede administrar concomitantemente con la NE
CARBIMAZOL	NEO TOMIZOL Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
CARVEDILOL	COROPRES Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
CEFADROXILO	DURACEF Suspensión	SUSPENSIÓN (250mg/5ml) Administrar directamente		Se puede administrar concomitantemente con la NE
CEFIXIMA	DENVAR Suspensión	SUSPENSIÓN (100mg/5ml) Administrar directamente		Administrar separadamente de la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
CEFUROXIMA- AXETILO	ZINNAT Comprimidos Sobres Suspensión	SOBRES 1 comp 500mg = 2 sobres 250mg Disolver en 20 ml de agua		Administrar concomitantemente con la NE para optimizar la absorción
CICLOFOSFAMIDA	GENOXAL Grageas	Solicitar preparación de fórmula magistral extemporánea al Servicio de Farmacia <sup>3</sup>		
CICLOSPORINA	SANDIMUN NEORAL Solución	SOLUCIÓN (100mg/ml) 100 mg = 1ml 50 mg = 0.5 ml 25 mg = 0.25 ml Diluir en 50 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
CIPROFLOXACINO	CIPROFLOXACINO EFG Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
CIPROTERONA ACETATO	ANDROCUR Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
CITICOLINA	SOMAZINA Ampollas Gotas	AMPOLLAS (1g/4ml ó 500mg/4ml) Administrar directamente		Se puede administrar concomitantemente con la NE
CLARITROMICINA	CLARITROMICINA Comprimidos Suspensión	SUSPENSIÓN (250mg/5ml) 1 comp 500mg = 10ml Administrar directamente		Administrar preferentemente con la NE para disminuir molestias GI

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
CLINDAMICINA	DALACIN Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
CLOBAZAN	NOIAFREN Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
CLOMETIAZOL	DISTRANEURINE Cápsulas			No se recomienda administración por sonda Sustituir por hidrato de cloral (fórmula magistral)
CLOMIPRAMINA	ANAFRANIL Grageas	GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE No utilizar los comprimidos, son de liberación retardada
CLONAZEPAM	RIVOTRIL Comprimidos Gotas	GOTAS (2.5mg/ml) 1 comp 0.5mg = 0.2 ml = 4gotas 1 comp 2 mg = 0.8 ml = 16gotas Disolver en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
CLONIDINA	CATAPRESAN Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
CLOPERASTINA	SEKISAN Jarabe	JARABE (17.7mg/5ml) Diluir en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE

RINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
CLOPIDOGREL	ISCOVER Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
CLORAZEPATO DIPOTÁSICO	TRANXILIUM Cápsulas Comprimidos	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
CLORAMBUCILO	LEUKERAN Comprimidos	Solicitar preparación de fórmula magistral extemporánea al Servicio de Farmacia		
CLOROQUINA	RESOCHIN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
CLORPROMAZINA	LARGACTIL Ampollas Comprimidos Gotas	GOTAS (40mg/ml) 25 mg = 0.6 ml = 13 gotas 100 mg = 2.5 ml = 50 gotas Administrar directamente	AMPOLLAS (25mg/5ml) 25 mg = 5ml 100 mg = 20 ml Administrar directamente	Administrar separadamente de la NE
CLORTALIDONA	HIGROTONA Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
CLOTIAPINA	ETUMINA Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
CLOXACILINA	ORBENIN Cápsulas Jarabe	JARABE (125mg/5ml) 1 cáp 500mg = 20 ml Administrar directamente	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua	Administrar separadamente de la NE
CLOZAPINA	LEPONEX Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
CODEÍNA	CODEISAN BISOLTUS Comprimidos Solución	SOLUCIÓN (10mg/5ml) 1 comp $\cong$ 5-10 ml Administrar directamente	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE
COLESTIRAMINA	RESINCOLESTIRAMINA Sobres	SOBRES Disolver en 150 ml de agua		Administrar separadamente de la NE No administrar sin diluir, volumen mínimo: 150 ml
COTRIMOXAZOL	SEPTRIM SEPTRIM FORTE Comprimidos Suspensión	SUSPENSIÓN (200/40mg/5ml) 1 comp 400/80mg = 10ml 1 comp 800/160mg = 20ml Diluir en 50 ml de agua	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua	Administrar separadamente de la NE
DEFLAZACORT	DEZACOR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua	GOTAS <sup>1</sup> (22.75mg/ml) 6 mg $\cong$ 0.26 ml $\cong$ 5 gotas 30mg $\cong$ 1.32ml $\cong$ 26 gotas Diluir en 10 ml de agua	Administrar preferentemente con la NE para disminuir molestias GI
DEXAMETASONA FOSFATO	FORTECORTIN Ampollas Comprimidos	AMPOLLAS (4mg/ml) 1 comp 1mg = 0.25 ml Administrar directamente		Se puede administrar concomitantemente con la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO	POLARAMINE Ampollas Comprimidos Jarabe	JARABE (2mg/5ml) 2 mg = 5 ml 6 mg = 15 ml Administrar directamente	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE No emplear las formas repetabs , son de liberación retardada
DEXTROMETORFANO	ROMILAR Gotas	GOTAS (15mg/ml) Administrar directamente		Se puede administrar concomitantemente con la NE
DIAZEPAM	VALIUM Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
DICLOFENACO	VOLTAREN Comprimidos			No pulverizar los comprimidos, tienen cubierta entérica Sustituir por Ibuprofeno
DIDANOSINA	VIDEX Cápsulas Polvo	COMPRIMIDOS <sup>2</sup> Dispersar dos comprimidos en 50 ml de agua		Administrar separadamente de la NE No utilizar las cápsulas (son gastrorresistentes) ni el polvo (se prepara con Alugel)
DIGOXINA	DIGOXINA EFG Ampollas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua	AMPOLLAS (0.25mg/ml) 1 comp 0.25mg = 1 amp Administrar directamente	Administrar separadamente de la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
DILTIAZEM	DINISOR MASDIL RETARD Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE No emplear las formas retard
DIPIRIDAMOL	PERSANTIN Ampollas Grageas	GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
DOMPERIDONA	MOTILIUM Comprimidos Suspensión	SUSPENSIÓN (5mg/5ml) 1 comp 10mg = 10ml Administrar directamente	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua	Administrar separadamente de la NE
DOXAZOSINA	CARDURAN NEO Comprimidos	COMPRIMIDOS <sup>1</sup> Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE No administrar formas neo, son de liberación controlada
DOXICICLINA	VIBRACINA Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
EFAVIRENZ	SUSTIVA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
EMTRICITABINA	EMTRIVA Cápsulas	SOLUCIÓN <sup>2</sup> (10mg/ml) 1 comp 200mg = 20ml Administrar directamente	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE



PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF A CONSEJADA	SE, SY FF A CONSEJADA	OBSERVACIONES
EMTRICITABINA TENOFIVIR	TRUVADA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar concomitantemente con la NE para optimizar la absorción
ENALAPRILLO	RENITEC Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
ERITROMICINA	ERITROGOBENS Comprimidos Suspensión	SUSPENSIÓN (125mg/5ml) 1 comp 500 mg = 20 ml Administrar directamente	SOBRES <sup>1</sup> Disolver en 50 ml de agua	Administrar separadamente de la NE
ESPIRONOLACTONA	ALDACTONE Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
ESTAVUDINA	ZERIT Cápsulas Solución	SOLUCIÓN (5mg/5ml) 1 cáp 30mg = 30ml // 1 cáp 40mg = 40ml Administrar directamente		Administrar separadamente de la NE
ESTREPTOQUINASA ESTREPTODORNASA	VARIDASA Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
ETAMBUTOL	MYAMBUTOL Grageas	GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar preferentemente con la NE para disminuir molestias GI

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
ETOPÓSIDO	VEPESID Cápsulas Viales	Solicitar preparación de fórmula magistral extemporánea al Servicio de Farmacia <sup>3</sup>		
FENITOINA	EPANUTIN NEOSIDANTOINA Cápsulas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Administrar separadamente de la NE No se aconseja administrar cápsulas
FENOBARBITAL	LUMINALETAS LUMINAL Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
FINASTERIDE	PROSCAR Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
FITOMENADIONA	KONAKION Ampollas	AMPOLLAS Administrar directamente		Se puede administrar concomitantemente con la NE
FLECAINIDA	APOCARD Comprimido	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
FLUCONAZOL	FLUCONAZOL EFG DIFLUCAN Cápsulas Suspensión	SUSPENSIÓN (200mg/5ml) 1 cáp 100mg = 2.5ml Administrar directamente	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
FLUDROCORTISONA	ASTONIN MERCK Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
FLUNITRAZEPAM	ROHIPNOL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
FLUOXETINA	RENEURON Comprimidos dispersables	COMPRIMIDOS Dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
FLURAZEPAM	DORMODOR Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
FLUTAMIDA	EULEXIN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar preferentemente después de la NE
FÓLICO, ÁCIDO	ACFOL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
FOLINATO CÁLCICO	LEDERFOLIN Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
FOSAMPRENAVIR	TELZIR Comprimidos	SUSPENSIÓN <sup>2</sup> (50mg/ml) 1 comp 700mg = 14ml Diluir en 20 ml de agua	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersara en 30 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE
FOSFOMICINA	FOSFOCINA Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
FUROSEMIDA	SEGURIL Ampollas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua	AMPOLLAS (20mg/2ml) 1 comp 40mg = 4ml Diluir en 50 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE
GEMFIBROCILO	LOPID Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
GLIBENCLAMIDA	DAONIL Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
GLICAZIDA	DIAMICRON Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
GLIPICIDA	MINODIAB Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar antes de iniciar NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
GRANISETRÓN	KYTRIL Ampollas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
HALOPERIDOL	HALOPERIDOL Ampollas Gotas	GOTAS (2mg/ml) 1 amp 5mg = 2.5ml Administrar directamente		Administrar separadamente de la NE
HIDRALAZINA	HYDRAPRES Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
HIDROCLOROTIAZIDA	HIDROSALURETIL Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
HIDROCORTISONA	HIDROALTESONA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Administrar preferentemente con la NE para disminuir molestias GI
HIDROXIZINA	ATARAX Comprimidos	JARABE <sup>1</sup> (10mg/5ml) 1 comp 25mg = 12.5ml Administrar directamente	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE
HIERRO	FERO GRADUMET TARDYFERON GLUTAFERRO Comprimidos Gotas	GOTAS (170mg/ml = 30mg Fe <sup>+2</sup> /ml) 1 comp 325mg $\cong$ 1 comp 256.3mg $\cong$ 90mg Fe <sup>+2</sup> = 3ml = 60 gotas Administrar directamente	VIAL <sup>1</sup> Administrar directamente	Administrar separadamente de la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
IBUPROFENO	NEOBRUFEN DALSY Comprimidos Suspensión	SUSPENSIÓN (100mg/5ml) 1 comp 600mg = 30ml Administrar directamente	SOBRES <sup>1</sup> Disolver en 50 ml de agua	Administrar preferentemente con la NE para disminuir molestias GI
IMIPRAMINA	TOFRANIL Grageas	GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
INDINAVIR	CRIXIVAN Cápsulas duras	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
INDOMETAZINA	INACID Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua		Administrar preferentemente con la NE para disminuir molestias GI
ISONIAZIDA- PIRAZINAMIDA- RIFAMPICINA	RIFATER Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
ISONIAZIDA- PIRIDOXINA	CEMIDON 150-B6 Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
ISONIAZIDA- RIFAMPICINA	RIFINAH Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar separadamente de la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
ISOSORBIDA MONONITRATO	UNIKET Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
ITRACONAZOL	SPORANOX CANADIOL Cápsulas Solución	SOLUCIÓN (50mg/5ml) 1 cáp 100mg = 10ml Administrar directamente		Administrar separadamente de la NE
KETOCONAZOL	FUNGAREST Comprimidos	SUSPENSIÓN <sup>1</sup> (100mg/5ml) 1 comp 200mg = 10ml Administrar directamente		Administrar concomitantemente con la NE para optimizar la absorción
KETOROLACO	DROAL Ampollas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
KETOTIFENO	ZASTEN Solución	SOLUCIÓN (1mg/5ml) Administrar directamente		Se puede administrar concomitantemente con la NE
LABETALOL	TRANDATE Ampollas Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
LACTULOSA	DUPHALAC Sobres Solución	SOBRES Diluir en 20 ml de agua		
LAMIVUDINA	EPIVIR Comprimidos Solución	SOLUCIÓN (50mg/5ml) 1 comp 150mg = 15ml 1 comp 300mg = 30ml Administrar directamente	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE
LAMIVUDINA- ZIDOVUDINA	COMBIVIR Comprimidos recubiertos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
LEVODOPA- CARBIDOPA	SINEMET Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
LEVODOPA- BENSERAZIDA	MADOPAR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
LEVOFLOXACINO	TAVANIC Comprimidos recubiertos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20ml de agua		Administrar separadamente de la NE
LEVOMEPRMAZINA	SINOGAN Comprimidos Gotas	GOTAS (40mg/ml) 1 comp 25mg $\cong$ 0.6ml $\cong$ 12 gotas 1 comp 100mg $\cong$ 2.5 ml $\cong$ 50 gotas Administrar directamente		Administrar separadamente de la NE



PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
LEVOTIROXINA	LEVOTHROID Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
LINEZOLID	ZYVOXID Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
LITIO CARBONATO	PLENUR Comprimidos de liberación sostenida	Solicitar preparación de fórmula magistral extemporánea al Servicio de Farmacia		Se puede administrar concomitantemente con la NE
LOPERAMIDA	FORTASEC Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
LOPINAVIR- RITONAVIR	KALETRA Comprimidos recubiertos Solución	SOLUCIÓN (400-100mg/5ml) 1 comp 200-50mg = 2.5ml Administrar directamente	SOLUCIÓN Diluir en 20 ml de agua	Administrar concomitantemente con la NE
LORATADINA	LORATADINA EFG CLARITYNE Comprimidos Jarabe	JARABE (5mg/5ml) 1 comp 10mg = 10ml Administrar directamente	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua	Administrar separadamente de la NE
LORAZEPAM	IDALPREM ORFIDAL Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Administrar separadamente de la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
LORMETAZEPAM	NOCTAMID Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
MAPROTILINA	LUDIOMIL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
MEGESTROL ACETATO	MAYGACE MEGEFREN Comprimidos Sobres	SOBRES Diluir en 25 ml de agua	SOBRES Diluir en 50 ml de agua	Administrar separadamente de la NE
MELFALÁN	MELFALAN EFG Comprimidos	Solicitar preparación de fórmula magistral extemporánea al Servicio de Farmacia <sup>3</sup>		
MERCAPTOPURINA	MERCAPTOPURINA EFG Comprimidos	Solicitar preparación de fórmula magistral extemporánea al Servicio de Farmacia <sup>3</sup>		Administrar separadamente de la NE
MESALAZINA	CLAVERSAL Comprimidos gastroresistentes	ESPUMA RECTAL <sup>1</sup> (1g/aplicación)		No triturar los comprimidos, son de cubierta entérica
MESNA	UROMITEXAN Ampollas	AMPOLLAS Diluir en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
METADONA	METASEDIN Ampollas Comprimidos	Solicitar preparación de fórmula magistral (5mg/ml) extemporánea al Servicio de Farmacia	AMPOLLAS (10mg/ml) 1 comp 5mg = 0.5ml Administrar directamente	Se puede administrar concomitantemente con la NE
METAMIZOL MAGNÉSICO	NOLOTIL METAMIZOL EFG Ampollas Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua	AMPOLLAS (2g/5ml) 1 cáp 575mg $\cong$ 1.44ml Diluir en 20 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE
METFORMINA	DIANBEN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
METILDOPA	ALDOMET Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
METILPREDNISOLONA	URBASON Ampollas Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Administrar concomitantemente con la NE
METOCLOPRAMIDA	PRIMPERAN Ampollas Comprimidos Solución	SOLUCIÓN (5mg/5ml) 1 comp 10mg = 10ml Diluir en 20 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
METOTREXATO	METOTREXATO EFG Comprimidos	Solicitar preparación de fórmula magistral extemporánea al Servicio de Farmacia <sup>3</sup>		Administrar separadamente de la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
METRONIDAZOL	FLAGYL METRONIDAZOL EFG Ampollas Comprimidos Suspensión	SUSPENSIÓN (200mg/5ml = 125 mg metronidazol/5ml) 1 comp 250mg = 10ml Administrar directamente	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua	Administrar preferentemente con la NE para disminuir molestias GI
MICOFENOLATO	CELLCEPT Cápsulas Comprimidos Suspensión	SUSPENSIÓN (1g/5ml) 1 cáp 250mg = 1.25ml 1comp 500mg = 2.5ml Administrar directamente	SUSPENSIÓN Diluir en 50 ml de agua	Administrar separadamente de la NE
MIDAZOLAM	DORMICUM Ampollas	AMPOLLAS (5mg/5ml ó 15mg/3ml) Diluir con 5 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
MORFINA SULFATO	SKENAN SEVREDOL ORAMORPH Cápsulas Comprimidos Solución	SOLUCIÓN (20mg/ml) Administrar directamente CÁPSULAS Abrir y dispersar los gránulos en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
NAPROXENO	NAPROXENO EFG Comprimidos	SOBRES <sup>1</sup> Disolver en 50 ml de agua		Administrar preferentemente con la NE para disminuir molestias GI

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
NELFINAVIR	VIRACEPT Comprimidos Polvo	POLVO (50mg/g) 1 comp 250mg = 5g Mezclar con agua		Administrar concomitantemente con la NE
NEVIRAPINA	VIRAMUNE Comprimidos Suspensión	SUSPENSIÓN (50mg/5ml) 1 comp 200mg = 20ml Administrar directamente	SUSPENSIÓN Diluir en 20 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE
NIFEDIPINO	ADALAT Cápsulas ADALAT OROS Comprimidos			No triturar los comprimidos, son de liberación prolongada Administrar sublingual ó fórmula magistral
NIMODIPINO	BRAINAL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de mezcla hidroalcohólica (3:1) <sup>4</sup>		Administrar separadamente de la NE
NISTATINA	MYCOSTATIN Suspensión	SUSPENSIÓN (100000 U/ml) Diluir en 20 ml de agua	SUSPENSIÓN Diluir en 50 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE
NITROGLICERINA	SOLINITRINA Comprimidos sublinguales			Administración sublingual
NORFLOXACINO	NOROXIN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar separadamente de la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
OLANZAPINA	ZYPREXA VELOTAB Comprimidos bucodispersables			Utilizar comprimidos bucodispersables (velotab)
OMEPRAZOL	CEPRANDAL Cápsulas	Solicitar preparación de fórmula magistral extemporánea al Servicio de Farmacia		
ONDANSETRON	YATROX Ampollas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua	AMPOLLAS (4mg/2ml u 8mg/4ml) Administrar directamente	Se puede administrar concomitantemente con la NE
PARACETAMOL	TERMALGIN APIRETAL Comprimidos Gotas	GOTAS (100mg/ml) 1 comp 500mg = 5ml 1 comp 650mg = 6.5ml Administrar directamente	GOTAS Diluir en 30 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE
PARACETAMOL CODEÍNA	TERMALGIN CODEÍNA Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
PAROMOMICINA	HUMATIN Solución	SOLUCIÓN (125mg/5ml) Diluir en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
PAROXETINA	FROSINOR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Administrar concomitantemente con la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
PENICILAMINA	CUPRIPEN Comprimidos	CÁPSULAS <sup>1</sup> (250mg) Abrir y dispersar en 10 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
PENTOXIFILINA	HEMOVAS Ampollas Grageas	AMPOLLAS (300mg/15ml) 1 gragea 400mg = 20ml Administrar directamente		Se puede administrar concomitantemente con la NE
PERFENAZINA	DECENTAN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de mezcal hidroalcohólica (3:1) <sup>4</sup>		Se puede administrar concomitantemente con la NE
PERGOLIDA	PHARKEN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
PIRACETAM	NOOTROPIL CICLOFALINA Ampollas Comprimidos	AMPOLLAS (3g/15ml) 1 comp 800mg = 4ml Administrar directamente	SOBRES <sup>1</sup> (800mg) Disolver en 50 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE
PIRAZINAMIDA	PIRAZINAMIDA EFG Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
PIRIDOSTIGMINA BROMURO	MESTINON Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
PIRIDOXINA	BENADON Ampollas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
PIRIMETAMINA	DARAPRIM Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
PIROXICAM	FELDENE FLAS Comprimidos Liotabs			Disolver las formas liotabs directamente en la boca Administrar preferentemente con la NE para disminuir molestias GI
POTASIO	BOI-K Comprimidos Efervescentes	COMPRIMIDOS Disolver en 20 ml de agua y agitar hasta finalizar la efervescencia		Se puede administrar concomitantemente con la NE
PREDNISOLONA	ESTILSONA Gotas	GOTAS (13.3mg/ml) Administrar directamente		Administrar preferentemente con la NE para disminuir molestias GI Agitar antes de usar
PREDNISONA	PREDNISONA EFG DACORTIN Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Administrar preferentemente con la NE para disminuir molestias GI



PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
PRIMIDONA	MYSOLINE Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
PROCAINAMIDA	BIOCORYL Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua		
PROCARBAZINA	NATULAN Cápsulas	Solicitar preparación de fórmula magistral extemporánea al Servicio de Farmacia <sup>3</sup>		
PROPAFENONA	RYTMONOR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		
PROPILTIOURACILO	PROPYCIL Tabletas	Solicitar preparación de fórmula magistral extemporánea al Servicio de Farmacia		
PROPRANOLOL	SUMIAL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
PROTIONAMIDA	PETEHA Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de mezcla hidroalcohólica <sup>4</sup>	Se puede administrar concomitantemente con la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
RAMIPRILO	ACOVIL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
RANITIDINA	ZANTAC Ampollas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
RIBAVIRINA	REBETOL Cápsulas duras	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua		Administrar concomitantemente con la NE
RIFAMPICINA	RIFALDIN Cápsulas Suspensión	SUSPENSIÓN (100mg/5ml) 1 comp 300mg = 15ml 1 comp 600mg = 30ml Administrar directamente		Administrar separadamente de la NE
RILUZOL	RILUTEK Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
RISPERIDONA	RISPERDAL Comprimidos Solución	SOLUCIÓN (1mg/ml) 1 comp 1mg = 1ml 1 comp 3mg = 3ml Administrar directamente		Se puede administrar concomitantemente con la NE
RITONAVIR	NORVIR Cápsulas blandas	SOLUCIÓN <sup>2</sup> (80mg/ml) 1 cáp 100mg = 1.25ml Administrar directamente	CÁPSULAS Extraer el contenido de la cápsula y diluir con 10 ml de mezcla hidroalcohólica <sup>4</sup>	Administrar concomitantemente con la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
SAQUINAVIR	INVIRASE Cápsulas Comprimidos	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua		Administrar concomitantemente con la NE
SELEGILINA	PLURIMEN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Administrar concomitantemente con la NE
SERTRALINA	BESITRAN Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
SIMVASTATINA	ZOCOR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de mezcla hidroalcohólica <sup>4</sup>		Administrar preferentemente con la última toma de la NE
SIROLIMUS	RAPAMUNE Cápsulas Solución	SOLUCIÓN (1mg/ml) Dosis iguales o inferiores a 2mg (cáp ó sol) se consideran bioequivalentes. Dosis superiores no. Diluir en 50 ml de agua		Administrar con o sin la NE pero siempre del mismo modo. Después de cada administración lavar la sonda con al menos 50 ml de agua
SOTALOL	SOTAPOR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
SUCRALFATO	URBAL Sobres			Debido a su frecuencia de administración y al riesgo de interacción con la NE se recomienda sustituir por un anti-H2
SULFADIAZINA	SULFADIAZINA EFG Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
SULFASALAZINA	SALAZOPYRINA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de bicarbonato 1M		Administrar preferentemente con la NE para disminuir molestias GI
SULPIRIDA	TEPAVIL DOGMATIL Ampollas Comprimidos	SOLUCIÓN <sup>1</sup> (25mg/5ml) 1 comp 50mg = 10ml Diluir en 50 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
TACROLIMUS	PROGRAF Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
TAMOXIFENO	NOLVADEX Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
TENOFOVIR	VIREAD Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Administrar preferentemente con la NE
TEOFILINA	EUFILINA VENOSA THEO DUR Ampollas Comprimidos	AMPOLLAS Administrar directamente	SOLUCIÓN <sup>1</sup> (27mg/5ml) 1 comp 200mg = 37ml 1 comp 300mg = 55.5ml Diluir en 20 ml de agua	Administrar separadamente de la NE
TETRAZEPAM	MYOLASTAN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
TIAMAZOL	TIRODRIL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
TIAMINA	BENERVA Ampollas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
TIAPRIDA	TIAPRIZAL Ampollas Comprimidos	GOTAS <sup>1</sup> (12mg/ml) 1 comp 100mg = 8.3ml Administrar directamente		Se puede administrar concomitantemente con la NE
TICLOPIDINA	TICLOPIDINA EFG Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar preferentemente con la NE para disminuir molestias GI y optimizar la absorción

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
TIETILPERAZINA	TORECAN Grageas	GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		
TIOGUANINA	TIOGUANINA EFG	Solicitar preparación de fórmula magistral extemporánea al Servicio de Farmacia <sup>3</sup>		
TORASEMIDA	DILUTOL Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
TRAMADOL	ADOLONTA Cápsulas	SOLUCIÓN <sup>1</sup> (100mg/ml) 1 cáp 50mg = 0.5ml Administrar directamente		Se puede administrar concomitantemente con la NE
TRANEXÁMICO, ÁCIDO	AMCHAFIBRIN	AMPOLLAS (500mg/5ml) Administrar directamente	AMPOLLAS Diluir en 20 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE
TRAZODONA	DEPRAX Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10ml de agua		Administrar preferentemente después de la NE
TRIFLUSAL	DISGREN Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua		Administrar preferentemente con la NE para disminuir molestias GI

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
TRIHEXIFENIDILO	ARTANE Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		Administrar concomitantemente con la NE
URSODESOXICÓLICO	URSOCHOL Comprimidos	Solicitar preparación de fórmula magistral extemporánea al Servicio de Farmacia		Administrar preferentemente con la NE
VALPROICO, ÁCIDO	DEPAKINE Comprimidos Solución	SOLUCIÓN (200mg/ml) 1 comp 200mg = 1ml 1 comp 500mg =2.5ml Administrar directamente		Administrar preferentemente con la NE
VENLAFAXINA	DOBUPAL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar concomitantemente con la NE No utilizar la formas de liberación retardada
VERAPAMILO	MANIDON Grageas	Solicitar preparación de fórmula magistral extemporánea al Servicio de Farmacia		Se puede administrar concomitantemente con la NE
VIGABATRINA	SABRILEX Sobres	SOBRES Disolver en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE
VITAMINA B COMPLEJO	HIDROXIL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Se puede administrar concomitantemente con la NE

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	SNG, SG FF ACONSEJADA	SE, SY FF ACONSEJADA	OBSERVACIONES
VORICONAZOL	VFEND Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
ZALCITABINA	HIVID Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
ZIDOVUDINA	RETROVIR Cápsulas Solución	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua		Administrar separadamente de la NE
ZOLPIDEM	STILNOX Comprimidos	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua		Administrar separadamente de la NE

1. Especialidad no disponible en el Complejo Hospitalario de Badajoz. Necesaria receta médica.
2. Especialidad no disponible en el Complejo Hospitalario de Badajoz. Consultar con el Servicio de Farmacia.
3. Medicamento citostático: manipular con precaución.
4. Solicitar preparación de mezcla hidroalcohólica al Servicio de Farmacia.